



49 Mon chien boite

Un symptôme simple pour de multiples causes !

Il claudique, il balance l'encolure comme un cheval, lève la patte, hésite. Il faut inspecter chacun des membres.

L'origine est plus souvent douloureuse, plus rarement mécanique.

La douleur peut être très superficielle (la peau ou les griffes) ou bien plus profondes (les os, articulations, ligaments).

Les grandes causes sont simples:

Il faut rechercher d'abord

- Les griffes partiellement cassées ou arrachées
- Les corps étrangers dans les coussinets
- Les ergots incarnés qui s'enroulent dans la peau
- Les inflammations, macérations ou fistules (épillettes) entre les doigts
- Des parasites, comme les aoutats

C'est parfois plus grave avec

- Des fractures osseuses (accidents de la circulation ou articulaires (le fameux coup de pied dans les pattes pour faire bouger ou obéir....))
- Des subluxations de la rotule (cas typique du petit chien qui court et lève la patte arrière en sautillant 3 ou 4 fois puis la repose une fois que la rotule se remet en place) ou de la hanche (le chien reste effondré, assis)
- Un défaut de développement et de nutrition des os du jeune (régime tout viande qui provoque des fractures en bois vert) ou des cartilages (ostéochondroses du labrador, ou plus généralement sur tous les chiens à croissance rapide dès l'âge de 5 mois)
- Des inflammations articulaires : arthrose (voir mémo Husse) ou arthrite aigue
- Des infections ou des tumeurs osseuses, plus rares
- Des affections neurologiques : dégénérescence du cervelet chez le Berger Allemand (qui ne sait plus positionner ses pieds; hernie discale chez les bassets....)
- Des problèmes parasitaires : leishmaniose (transmis par les rongeurs), maladie de Lyme (transmis par les tiques)

En prenant articulation par articulation,

- Epaule : luxations fréquentes chez le Caniche ou le Chihuahua dès la naissance, tendinite chez le chien de chasse, ostéochondrose
- Coude : luxations chez le Colley, Setter et Cocker (de la naissance à 2mois), ostéochondrose
- Hanche : dysplasie chez les grandes races (entre 6 et 12 mois), arthrose chez les chiens lourds, nécrose de la tête du fémur chez le Caniche
- Genou : luxation de la rotule chez le Caniche et les chiens toys

Les précautions à prendre sont aussi simples:

- Couper régulièrement les griffes, à l'aide d'une pince coupante de taille adaptée : bien visualiser la partie charnue en transparence et couper au delà en biais dans le sens de la pousse pour conserver la même forme de griffe (voir le guide du chiot)
- Epiler les espaces entre les doigts si le chien marche dans des zones humides
- Graisser les coussinets en hiver rude, ou les tanner à l'acide picrique pour épaissir la couche cornée s'il vit sur une surface bétonnée (chenil ou pension). En cas d'infection, il existe des sprays antiseptiques ou pansements.
- Détecter la zone douloureuse en palpant ou mobilisant très délicatement le membre atteint (attention le chien abaisse toujours la tête du côté opposé au membre atteint, et il peut mordre s'il a très mal) et consulter rapidement
- En cas d'entorse, un bandage de huit jours est recommandé, mais ne vous lancez pas dans une automédication avec des anti-inflammatoires : seul votre vétérinaire peut choisir le bon médicament et la bonne dose !

Faites ainsi confiance aux experts de Husse pour vous conseiller et entretenir la vitalité de votre compagnon !