



53 Le cycle sexuel de la chienne

A bien connaître pour rester maître de la situation...

La sexualité de nos amis canins fonctionne par cycle avec des périodes faciles à repérer.

La bonne connaissance de ces cycles permet soit d'éviter des chiots non désirés ou, au contraire, de promouvoir les caractéristiques génétiques de votre compagnon au moment voulu.

A quel âge tout commence-t-il ?

L'âge moyen de la puberté est de 9 à 12 mois.

La race influence cependant considérablement l'apparition des premières chaleurs : les petites races sont précoces à 6 mois (parfois à 4 !), les grandes sont plus tardives à 12 mois, voire 18 ans pour les géantes.

La chronologie des cycles

Il s'en produit 2 par an (parfois 3 ou 4 chez les femelles de petite taille, une seule fois chez le Basenji). Habituellement les cycles ont lieu plutôt au printemps et en automne, mais là encore il n'y a pas de loi absolue.

Chaque cycle dure 6 à 7 mois avec plusieurs phases. Contrairement au chat, chaque cycle ne présente qu'une seule période de chaleurs.

Les « chaleurs » durent 3 semaines.

La première partie des chaleurs (prooestrus) dure 10 jours environ : la vulve est gonflée, des saignements apparaissent. Cette phase est donc facile à reconnaître. Le mâle n'est pas accepté à ce moment, mais eux cherchent.

Au bout de ces 10 jours, l'ovulation a lieu spontanément et la femelle recherche activement les prétendants. Les saignements s'arrêtent alors. On est dans l'œstrus.

Bien entendu, tout serait trop simple si ces cycles étaient mathématiques. Malheureusement, il existe une forte variabilité entre races et entre individus. La durée de la première phase, facilement reconnaissable, varie entre 7 et 10 jours ; celle de la deuxième entre 4 et 10 jours. Moins facile !...

S'il n'y a pas de fécondation, le cycle passe en phase de silence pour une période 2 mois, puis de repos sexuel total pour 3 à 5 mois. Vous pouvez dormir tranquilles.

Reproduction

Si saillie il y a eu (et le papa ne viendra pas se présenter...), il y a de fortes chances qu'il y ait eu fécondation.

Si vous voulez accroître les chances, le meilleur moment de la saillie est 48h après de l'ovulation : c'est donc 2 à 3 jours après le début de l'œstrus. Pour vous faciliter le

décompte, gardez en tête 2 semaines après le début des pertes. Pour être très prudent si vous ne voulez pas de portée, isolez votre chienne une semaine entre 10 et 17 jours après le début des pertes.

Si vous cherchez par contre à avoir des chiots, il est recommandé de renouveler l'accouplement à 2 jours d'intervalle en visant le 11^{ème} et 13^{ème} jour.

Gestation

La nidation a lieu le 18^{ème} jour chez la chienne. La gestation dure 2 mois environ : 63 jours en moyenne avec des variations de 58 à 70 jours.

Le diagnostic est plus ou moins facile selon la taille. Rien n'est vraiment palpable avant la 3^{ème} semaine. A 1 mois, vous pourrez palper des mandarines.

Vers 45 jours, la radiographie peut permettre de décompter précisément le nombre de têtes car les os sont alors calcifiés.

Bien sûr, l'échographie permet de détecter plus tôt au cours de la troisième semaine, le nombre de fœtus dès la 4^{ème}.

Les mamelles commencent à se développer au cours du deuxième mois.

Il peut arriver que certaines chiennes développent une fausse gestation avec des comportements de maternage et même un démarrage de lactation. Si cela se produit à chaque fois, consultez votre véto pour une prévention hormonale.

Portée

La chienne peut mettre bas de 2 à 8 chiots. Il y a bien sûr des cas exceptionnels (plus de vingt). Tout dépend de la taille du papa, qui n'est pas toujours connu.

Les chaleurs reviennent entre 3 et 5 mois. Au bout du premier mois, la femelle repousse les chiots : c'est le sevrage qui commence.

Sachez enfin qu'il n'y a pas de ménopause chez la chienne, l'activité diminuant simplement peu à peu au cours du vieillissement.

Faites ainsi confiance aux experts de Husse pour vous conseiller et vous informer tout au long de la vie de votre compagnon !